

РАК ЖЕЛУДКА

ВТОРОЙ ПО ОПАСНОСТИ.

Среди факторов, способствующих развитию рака желудка, называются особенности диеты и факторы окружающей среды, курение, инфекционные и генетические факторы.



КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВИДОВ ОПУХОЛЕЙ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

11,5%

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ

13,5%

СМЕРТНОСТЬ

15,8%

МУЖЧИНЫ

12,4%

ЖЕНЩИНЫ

ВСЕМ ЛИЦАМ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ:

- ПРОВОДИТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДКА (ЕЖЕГОДНО);
- СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ КРОВИ, КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ (ЕЖЕГОДНО);
- НАБЛЮДЕНИЕ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА.

Рак желудка на ранних стадиях, как правило, имеет невыраженные клинические проявления и неспецифические симптомы:

- диспепсия;
- снижение аппетита.

Другие симптомы рака желудка (так называемый синдром «малых признаков»):

- астения;
- анемия;
- потеря веса.

На поздних стадиях присоединяются:

- боли в эпигастрии;
- рвота;
- кровотечения при изъязвлении и распаде опухоли.



ФАКТОРЫ РИСКА

- Возраст старше 50 лет
- Избыточный вес и ожирение
- Курение
- Злоупотребление алкоголем
- Малоподвижный образ жизни
- Сахарный диабет 2 типа
- Воспалительные заболевания кишечника
- Полипы толстой кишки (бессимптомные доброкачественные опухоли толстой кишки)

КЛЮЧЕВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА ЯВЛЯЕТСЯ

КОЛОНОСКОПИЯ ее следует проводить каждые 5 лет

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ И СПАСЕНИЯ

Колоректальный рак протекает бессимптомно, но есть ряд косвенных признаков:

- боль при дефекации;
- диарея, запор, изменение количества стула
- кровотечение из прямой кишки или кровь в стуле;
- Беспричинная потеря веса.

Заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков? Обратитесь к терапевту, хирургу или колопроктологу!