

## **Подготовка к эзофагогастродуоденоскопии**

За 2 -3 дня до исследования необходимо отказаться от острых блюд и алкогольных напитков, 1 день прекратить прием препаратов железа и активированного угля.

Вечером накануне исследования легкий ужин в 19 - 20 часов,

За 4 - 5 часов не курить

За 2 часа можно выпить при необходимости 1 \ 2 стакана прозрачной воды.

Пациенты, страдающие гипертонией, должны измерить АД, и при повышенных показателях принять препараты, снижающие АД.

При себе на приеме необходимо иметь полотенце, сменную обувь, страховой полис, результаты предыдущих исследований.

## **Подготовка к видеотрахеобронхоскопии**

Перед исследованием необходимо пройти рентгеноскопию легких или компьютерную томографию с заключением специалистов, ЭКГ с расшифровкой. Кровь на свертываемость, кровоточивость.

Вечером накануне исследования легкий ужин в 19- 20 часов,

За 4-5 часов не курить

За 2 часа можно выпить при необходимости 1 \ 2 стакана прозрачной воды.

Пациенты . страдающие гипертонией, должны измерить АД, и при повышенных показателях принять препараты, снижающие АД.

При себе на приеме необходимо иметь полотенце, сменную обувь, страховой полис, результаты исследований.